

TABLA DE AJUSTE DE DOSIS DE CITRATO-CALCIO Prismaflex:

Ca++ Postfiltro	Cambio de dosis de CITRATO		Ca++ Paciente	Cambio de dosis de CALCIO
>0,45	Aumentar 1 mmol/l y avisar MG		>1,45	Disminuir 20%
0,41-0,45	Aumentar 1 mmol/l		1,25-1,45	Disminuir 10%
0,35-0,40	Aumentar 0,5 mmol/l		1,10-1,24	Disminuir 5%
0,25-0,34	No cambiar nada		0,9-1,10	No cambiar nada
0,20-0,24	Disminuir 0,5 mmol/l		0,85-0,9	Aumentar 5%
0,15-0,19	Disminuir 1 mmol/l		0,75-0,84	Aumentar 10%
<0,15	Disminuir 1,5 mmol/l y avisar MG		<0,75	Aumentar 20% y avisar MG

Ojo!! Si la dosis de CALCIO necesaria es > 150%, vigilar una posible acumulación de citrato. Si la dosis de CALCIO es >180%, valorar interrumpir la TCDE (Calcular el cociente Ca_{TOTAL}/Ca^{2+}).

El manejo específico de las alteraciones del equilibrio ácido/base también requiere entrenamiento y actitudes diferentes a los tratamientos que utilizan anticoagulación convencional (Anexo Citrato).